

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА

Основные задачи:

- 1) своевременное удаление экссудата из полости матки;
- 2) подавление жизнедеятельности патогенной микрофлоры во всех участках генитального аппарата;
- 3) восстановление тонуса и сократительной способности мускулатуры матки;
- 4) ускорение регенерации поврежденного эндометрия;
- 5) повышение защитных сил организма;
- 6) предотвращение интоксикации продуктами деятельности микробов.

ПРЕПАРАТ	СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ	РАЗОВАЯ ДОЗА	ДНИ ЛЕЧЕНИЯ				
			1	2	3	4...	10
СХЕМА №1							
Тилометрин	Внутриматочно	100-200 мл	+		+		
Ихглюковит	Паравагинально	10 мл/100 кг массы тела		+		+	
Инфларет	Подкожно	2,5мл/100 кг массы тела	+				
Мультивет	Внутримышечно	15-20 мл	+				+
Окситоцин	Подкожно	10 ед на 100 кг массы тела	+	+	+	+	+

СХЕМА №2

Фертадин	Внутримышечно	2-4 мл	+				+
Гистеросол	Внутриматочно	50 -200 мл	+		+		
Мультивет	Внутримышечно	15-20 мл	+				+
Ихглюковит	Паравагинально	10 мл на 100 кг массы тела		+		+	+

СХЕМА №3

Повиодон	Внутриматочно	10% раствор 100-200 мл	+		+		
Ихглюковит	Паравагинально	10 мл на 100 кг массы тела		+		+	+
Мультивет	Внутримышечно	15-20 мл	+				+
Юберин	Внутримышечно	20 мл	+	+	+	+	
Фертадин	Внутримышечно	2-4 мл	+				+
Инфларет	Подкожно	2,5мл/100 кг массы тела	+				

СХЕМА №4

Ветацеф 50	Внутримышечно	1 мл на 50 кг массы тела	+	+	+	+	+
Йотоин	Внутриматочно	100-200 мл	+		+		
Мультивет	Внутримышечно	10 мл	+				+
Юберин	Внутримышечно	10-25 мл	+	+	+	+	
Окситоцин	Подкожно	10 ед на 100 кг массы тела	+	+	+	+	+
Дексалека	Внутримышечно	5-10 мл	+				

Примечание: в тяжелых случаях, при интоксикации организма назначают внутривенно по 200 мл раствора глюкозы 40% и кальция хлорида 10% или кальция бороглюконата; **аверон** 50-60 мл в течении 5 дней, подкожно раствор кофеин-бензоата натрия 20%-10 мл.

Для достижения максимального лечебного эффекта антибактериальные препараты (тилометрин, ветацеф 50) применять после определения чувствительности микрофлоры(подтитровки). Схемы лечения применять до выздоровления животного. **Внутриматочные растворы вводить с интервалом 48-72 часа для поддержания терапевтической концентрации в тканях матки.**

Схемы лечения при подостром эндометрите

ПРЕПАРАТ	СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ	РАЗОВАЯ ДОЗА	ДНИ ЛЕЧЕНИЯ				
			1	2	3	4...	10

СХЕМА №1

Метрицеф	Внутриматочно	1 шприц-дозатор	+					+
Мультивет	Внутримышечно	15-20 мл	+					+
Фертадин	Внутримышечно	2 мл	+					
Ветацеф 50	Подкожно	1мл на 50 кг массы тела	+	+	+	+		

СХЕМА №2

Метрицеф	Внутриматочно	1 шприц-дозатор	+					+
Мультивет	Внутримышечно	10 мл	+					+
Окситоцин	Подкожно	10 ед на 100 кг массы тела	+	+	+	+	+	+
Ихглюковит	Паравагинально	10 мл на 100 кг массы тела		+			+	+

СХЕМА №3

Метрицеф	Внутриматочно	1 шприц-дозатор	+					+
Ветацеф 200	Подкожно	1мл на 30 кг массы тела	+	+	+	+		
Мультивет	Внутримышечно	10 мл	+					+
Юберин	Внутримышечно	20 мл	+	+	+	+		
Фертадин	Внутримышечно	2-4 мл	+	+				+

Схемы лечения при скрытом и хроническом эндометрите

ПРЕПАРАТ	СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ	РАЗОВАЯ ДОЗА	ДНИ ЛЕЧЕНИЯ				
			1	2	3	4...	10

СХЕМА №1

Метрицеф	Внутриматочно	1 шприц-дозатор	+					
Мультивет	Внутримышечно	10 мл	+					
Фертадин	Внутримышечно	2 мл	+					
Ветацеф 200	Подкожно	1мл на 30 кг массы тела	+					

СХЕМА №2

Метрицеф	Внутриматочно	1 шприц-дозатор	+					
Мультивет	Внутримышечно	10 мл	+					
Окситоцин	Подкожно	10 ед на 100 кг массы тела	+	+	+	+	+	+
Ветацеф 200	Подкожно	1 мл на 30 кг массы тела	+					