

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ЛЕЧЕНИЮ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СРАЗУ ПОСЛЕ ОТЕЛА:

- выпойка «ЭКОРПИТ – М». Содержимое пакета растворить в 5 литрах теплой воды (40-45⁰ С), а затем довести до объема 10 литров. Выпить однократно сразу после отела. Ослабленным коровам выпаивают один раз в день в течение 2-3 дней.

- внутримышечное введение 20 мл раствора «ЮБЕРИН». Препарат вводят на протяжении 5 дней. «ЮБЕРИН» регулирует обменные процессы, повышает тонус миометрия, уменьшает риск развития кетоза у коров.

- внутримышечное введение 2-4 мл раствора «ФЕРТАДИН». Препарат вводят однократно для снижения уровня прогестерона в крови; повышения действия утеротонических средств на миометрий; усиливает сокращение мускулатуры матки.

- внутримышечное введение 8-10 мл «МУЛЬТИВЕТ». Препарат вводят однократно для повышения активности животного, поддержания обменных процессов в организме.

Если после принятых мер послед в течение 24 часов после родов самопроизвольно не отделился, то делаем следующее:

- послед отделяем (оперативный метод) или не отделяем (консервативный метод);
- отрезаем ножницами выступающую часть последа (если не отделяли послед)
- вводим в матку пенообразующие таблетки (по выбору ветеринарного врача)

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ
УТЕРОВЕТ	внутриматочно	5-6 таблеток	однократно
УТЕРОЦЕФ	внутриматочно	5-6 таблеток	однократно

Примечание: пенообразующие внутриматочные таблетки применяются по выбору ветеринарного врача по степени чувствительности микрофлоры.

После задержания последа, как правило, у коров развивается эндометрит.

При тяжелом отёле, крупноплодии, разрывах применяем:

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЕТАЦЕФ 200	подкожно	1 мл/30 кг	однократно
ИНФЛАРЕТ	внутримышечно	2,5 мл/100 кг	однократно

Лечение эндометрита с внутриматочным введением жидких форм антибактериальных препаратов:

ПРЕПАРАТ	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗОВАЯ ДОЗА	ДНИ ЛЕЧЕНИЯ				
			1	2	3	4...	10
СХЕМА №1							
Тилометрин	Внутриматочно	100-200 мл	+		+		
Инфларет	Подкожно	2,5мл/100 кг массы тела	+				
Мультивет	Внутримышечно	8-10 мл	+				+
Окситоцин	Подкожно	10 ед на 100 кг массы тела	+	+	+	+	+

Примечание: Тилометрин вводить с интервалом 48 часов, в начале лечения 200 мл при завершении 100-50 мл.

ПРЕПАРАТ	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗОВАЯ ДОЗА	ДНИ ЛЕЧЕНИЯ				
			1	2	3	4...	10
СХЕМА №2							
Гистеросол	Внутриматочно	50-200 мл	+		+		
Дексалека	Внутримышечно	5-10 мл	+				
Мультивет	Внутримышечно	8-10 мл	+				+
Окситоцин	Подкожно	10 ед на 100 кг массы тела	+	+	+	+	+

Примечание: Гистеросол вводить с интервалом 24-48 часов, в начале лечения 200 мл при завершении 100-50 мл.

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА БЕЗ СРОКОВ ОЖИДАНИЯ ПО МОЛОКУ


ПРЕПАРАТ	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗОВАЯ ДОЗА	ДНИ ЛЕЧЕНИЯ				
			1	2	3	4...	8
СХЕМА №1							
Ветацеф 200	Подкожно	1 мл/ 30 кг	+				+
Мультивет	Внутримышечно	8-10 мл	+				+
Окситоцин	Подкожно	10 ед на 100 кг массы тела	+	+	+	+	+

Примечание: *Ветацеф 200 вводить с интервалом 7 суток. При необходимости курс продолжаем.*

ПРЕПАРАТ	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗОВАЯ ДОЗА	ДНИ ЛЕЧЕНИЯ				
			1	2	3	4...	8
СХЕМА №1							
Ветацеф 200	Подкожно	1 мл/ 30 кг	+				+
Метрицеф	Внутриматочно	20 г					
Мультивет	Внутримышечно	8-10 мл	+				+
Окситоцин	Подкожно	10 ед на 100 кг массы тела	+	+	+	+	+

Примечание: *Метрицеф применять с 14 дня после отёла.*

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ СКРЫТОГО ЭНДОМЕТРИТА



В следующую охоту осеменяем корову.

Синхронизация половой охоты у клинически здоровых новотельных коров через 25-35 дней после отела с целью профилактики дисфункции яичников (Presynch):

Дни введения	0	14	26	33	35
Препарат	Фертадин +Мультивет	Фертадин +Мультивет	Гонадин	Фертадин	Гонадин
Доза	2 мл +10 мл	2 мл +10 мл	2 мл	2 мл	2 мл

Коров, проявивших признаки половой охоты в период с 14 по 35 день применения схемы, осеменяют. Через 10-16 часов после последней инъекции Гонадина осеменяют коров, в том числе не проявивших признаки половой охоты.

Синхронизация половой охоты у клинически здоровых новотельных коров (OVSYNCH):

Дни введения	0	7	9
Препарат	Гонадин	Фертадин	Гонадин
Доза	2 мл	2 мл	2 мл

Лечение фолликулярных кист:

Дни введения	0	1	2	11
Препарат	Гонадин	Гонадин	Гонадин	Фертадин
Доза	2 мл	2 мл	2 мл	4 мл

Коров, проявивших признаки половой охоты, осеменяют. Если охота не проявилась в течение 7 суток после применения схемы, животных обследуют для определения причин.

Ветеринарный врач ООО «Белэкотехника»

С.В. Синкевич